



MÉTODO PARA REDUÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS

PESSOAS COM SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS DEVEM:



- Utilizar máscara cirúrgica



- Usar lenços de papel descartável para tosse, espirros ou secreção nasal e descartar após o uso (caso não haja lenço de papel, seguir a “etiqueta respiratória” cobrindo o rosto com o braço quando tossir ou espirrar)



- Realizar a higiene das mãos frequentemente com preparação alcoólica ou água e sabonete líquido

QUEM É CONTACTANTE PRÓXIMO?



- Pessoa que tenha contato físico direto (exemplo: aperto de mãos) ou contato frente a frente por 15 minutos ou mais



- Pessoas que estiveram em ambiente fechado (sala de espera de hospital, aeronaves...) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros



- Profissionais de saúde, cuidadores, colaboradores do laboratório, que entrem em contato com pessoas com COVID-19 ou manipulem amostras sem EPI
- Residir, compartilhar área com caso de COVID-19

QUANDO SUSPEITAR DE CORONAVÍRUS?



Situação 1: Febre e pelo menos um sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros), além de histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas



OU

Situação 2: Febre **ou** pelo menos um sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros), além de histórico de contato próximo de caso suspeito **ou** confirmado para o coronavírus, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas



OU

Situação 3: Febre **ou** pelo menos um sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) **ou** outros sinais e sintomas inespecíficos como: cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, calafrios, diarreia, náusea, vômito, falta de apetite, entre outros), em pessoas, nos últimos 14 dias, que morem **ou** trabalhem com pessoas de caso suspeitos **confirmado** para COVID-19.



saude.gov.br